

Agentes farmacoterapéuticos para el tratamiento del ADHD en adultos.		
Medicamentos y formulaciones	Dosis	Efectos adversos comunes
Medicamentos estimulantes		
Liberación inmediata		
Metilfenidato	10-60 mg/día en dosis divididas	Nerviosismo, insomnio, cefalea hipersensibilidad, anorexia, náuseas, mareos, discinesia, somnolencia, cambios en la presión arterial y el pulso, taquicardia, pérdida de peso, dolor abdominal, anorexia
Dexametilfenidato	dosis inicial: 5 mg/día (2,5 mg, 2 veces x día); se puede aumentar a intervalos semanales, 2,5-5 mg/día, hasta 20 mg/día	Dolor abdominal, fiebre, anorexia, náuseas, nerviosismo, insomnio
Anfetaminas	Dosis inicial: 10 mg/día; se puede aumentar 10 mg/día a intervalos semanales; dosis habitual: 5-60 mg/día	Sequedad de boca, anorexia, insomnio, cefalea, adelgazamiento, náuseas, ansiedad, agitación, mareos, taquicardia, diarrea, astenia, infecciones de las vías urinarias.
Dextroanfetamina	Dosis inicial: 10 mg/día, puede aumentarse 10 mg/día a intervalos semanales hasta obtener mejor respuesta; dosis habitual: 5-60 mg/día en dosis divididas.	Hipertensión arterial, taquicardia, palpitaciones, mareos, insomnio, temblor, diarrea, estreñimiento, sequedad de boca, urticaria, impotencia, cambios en la libido, euforia, discinesias, cefaleas.
Liberación sostenida		
Metilfenidato	Varía entre 10 y 72 mg/día, según la marca	Hipoerexia, cefaleas, boca seca, náusea, insomnio, ansiedad, mareos, adelgazamiento, irritabilidad, dolor del abdomen superior, hiperhidrosis, palpitaciones, taquicardia, depresión, nerviosismo.
Dexmetilfenidato	Dosis inicial: 10 mg; puede aumentarse 10 mg/semana hasta un máximo de 40 mg/día	Dispepsia, cefalea, ansiedad, insomnio, anorexia, boca seca, dolor faringolaríngeo, nerviosismo, mareos, hiporexia, vómitos
Anfetamina	20 mg a la mañana. Personas que pasan a tomar anfetamina de liberación inmediata: la dosis diaria total es la misma; la dosis se puede ajustar a intervalos semanales según se indica	Sequedad de boca, anorexia, insomnio, cefalea, dolor abdominal, adelgazamiento, agitación, ansiedad, náuseas, vómitos, mareos, taquicardia, nerviosismo, astenia, diarrea
Dextroanfetamina	5-60 mg/día en dosis divididas	Hipertensión arterial, taquicardia, palpitaciones, mareos, insomnio, temblor, diarrea, estreñimiento, sequedad de boca, urticaria, impotencia, cambios en la libido, euforia, discinesia, cefalea
Lisdexamfetamina dimesilato	Dosis inicial: 30 mg, se puede aumentar 10-20 mg/día a intervalos semanales hasta un máximo de 70 mg/día	Hipoerexia, insomnio, dolor del abdomen superior, irritabilidad, náuseas, vómitos, adelgazamiento, boca seca, mareo, inestabilidad afectiva, erupción, diarrea, ansiedad, anorexia, nerviosismo
Medicamentos no estimulantes		
Atomoxetina (inhibidor selectivo)	Dosis inicial: 40 mg/día; se puede aumentar hasta un	Dolor abdominal, náuseas, vómitos, fatiga, hiporexia, somnolencia, taquicardia, cefalea,

de la recaptación de norepinefrina)	máximo de 100 mg/día	boca seca, insomnio, estreñimiento, sofocos, tenesmo y retención urinaria, disfunción eréctil
-------------------------------------	----------------------	---