

Tabla 1 Cálculo del costo sanitario global medio de un paciente con gangrena de Fourier que requiere de ingreso en UCI y 2 curas en quirófano.

| Unidades de producto | Costo unitario | Valores medios (internación media y número medio de horas en quirófano utilizado) | Importe |
|--|---------------------|---|--|
| Internación en UCI | 1.609,65 euros/ día | 7,83 días | 12.603, 65 (1.609,65 x 7,83) |
| Internación en Urología | 373, 82 euros/ día | 27,5 días | 10.295 (373,82 x 27,5) |
| Utilización de quirófano con un cirujano | 884,05 euros/ hora | 2,5 horas | 2.210, 12 (884,05 x 2,5) 25.108, 67 euros |

Tabla 2 Relación de las variables medidas con la necesidad de estancia en UCI, estancia media hospitalaria y mortalidad.

| Variables de estudio | Número de pacientes GF | | Relación con estancia en UCI (p)a | Relación con la estancia media hospitalaria (p) | Relación con la mortalidad (p) |
|------------------------------------|------------------------|----|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| | SI | NO | | | |
| Alcoholismo | 8 | 29 | 8 (p = 0,000) | 29 (p = 0,760) | 2 (p = 0,283) |
| Diabetes mellitus | 16 | 21 | 4 (p = 0,399) | 24 (p = 0,357) | 2 (p = 0,875) |
| Cardiopatía isquémica | 9 | 28 | 4 (p = 0,376) | 12 (p = 0,007) | 4 (p = 0,002) |
| Pluripatología | 12 | 25 | 6 (p = 0,114) | 23 (p = 0,002) | 4 (p = 0,015) |
| Fístula perianal/absceso | 11 | 26 | 4 (p = 0,740) | 23 (p = 0,444) | 2 (p = 0,589) |
| Estenosis uretra | 6 | 31 | 3 (p = 0,315) | 14 (p = 0,791) | 0 (p = 0,290) |
| Sondaje previo | 0 | 37 | - | - | - |
| Sondaje posterior | 23 | 14 | 6 (p = 0,311) | 25 (p = 0,395) | - |
| Ingreso en UCI | 12 | 25 | - | 27 (p = 0,993) | 3 (p = 0,157) |
| Infección monomicrobiana | 15 | 22 | 4 (p = 0,536) | 29 (p = 0,698) | 2 (p = 0,959) |
| Infección polimicrobiana | 22 | 15 | 8 (p = 0,003) | 18 (p = 0,698) | 3 (p = 0,678) |
| Sutura secundaria | 5 | 32 | 13 (p = 0,049) | 46 (p = 0,000) | - |
| Reconstrucción con colgajo cutáneo | 2 | 35 | 5 (p = 0,855) | 34 (p = 0,002) | - |
| Reconstrucción con injerto cutáneo | 5 | 32 | 18 (p = 0,008) | 58 (p = 0,000) | - |
| Éxito | 5 | 32 | 3 (p = 0,157) | 7 (p = 0,009) | - |