




**Libros
Virtuales
IntraMed**



MALABSORCIÓN

Conjunto de signos y síntomas secundarios a un déficit nutricional, el cual puede deberse a una alteración de la digestión, absorción o transporte de los alimentos.

CLASIFICACIÓN

CUADRO CLÍNICO

Muy variable, pudiendo presentarse como un cuadro florido, con esteatorrea, pérdida de peso, distensión abdominal, astenia o como un hallazgo incidental de laboratorio (ej. anemia)

Recordar que el SMA puede producir síntomas y signos en la mayoría de los órganos y sistemas como ser aparato digestivo, dermatológico, hematológico, osteomuscular, endócrino y neurológico.

ENFOQUE DIAGNÓSTICO

- ❖ Interrogatorio
- ❖ Exámen físico completo

- ❖ Solicitar análisis de laboratorio completo, coproparitológico, AC para Enfermedad celíaca (antitransglutaminasa, antiendomiso, antigliadina II). Si éstos son (+), realizar VEDA con biopsia de 2da porción duodenal.
- ❖ Si no se llega al diagnóstico pasar a una segunda fase: solicitar esteatocrito o Van de Kamer, clearance de alfa 1-antitripsina y elastasa en materia fecal.

Bibliografía

1. Christoph Hogenauer. Maladigestión y malabsorción. Sleisenger and Fordtran. Enfermedades gastrointestinales y Hepáticas. Capítulo 89. Páginas 1863-1897. 2004
2. Heredia P C, Castro P F, Palma H J. Adult celiac disease. Rev Med Chil. 2007 Sep; 135(9):1186-94. Epub 2007 Nov 15.
3. Devesa JM, Botella-Carretero JI. Ultrashort bowel syndrome: surgical management and long-term results of an exceptional case. J Pediatr Surg. 2008 Mar;43(3):E5-9.
4. Petersen JM, Forsmark CE. Chronic pancreatitis and maldigestion. Semin Gastrointest Dis. 2002 Oct;13(4):191-9.